



Formulário de Prescrição de Imunizantes

1 - CNS – Cartão Nacional de Saúde

2 - CPF

3 - Nome Completo do Usuário - Civil*

4 - Nome Social

5 - Indicação:

6 - Imunizante(s) Prescrito(s)

Usuário PrEP

Imunizante Prescrito	Recomendação
Vacina contra hepatite B	Usuários suscetíveis à hepatite B*: 3 doses (0, 2, 6 meses)
Hepatite A	Sem comprovação vacinal: Duas doses (0, 6 meses) Com comprovação vacinal(uma dose): Complementar o esquema com mais uma dose 15 a 17 anos: Vacina pediátrica na dose de 0,5 mL. ≥ 18 anos: vacina adulto na dose de 1,0 mL.
Vacina contra HPV	15 a 45 anos: 3 doses (0, 2, 6 meses) - Não vacinar na gestação

*(HBsAg não reagente, anti-HBc total não reagente, anti-HBs não reagente)

Usuário TARV

Imunizante Prescrito	Recomendação
Hepatite B	Usuários suscetíveis à hepatite B*: 4 doses - dose dobrada de acordo com fabricante - (0, 1, 2 e 6 meses)
HPV	9 a 45 anos: 3 doses (0, 2 e 6 meses) - Não vacinar na gestação
Hepatite A	Duas doses, com intervalo de 6 a 12 meses, em indivíduos suscetíveis à hepatite A (anti-HAV não reagente)
Dupla do tipo adulto (dT)	Três doses (0, 2, 4 meses) e reforço a cada 10 anos. Gestantes: Uma ou duas doses a qualquer momento da gestação se vacinação incompleta do tétano e difteria.
dTpa	Gestantes: aplicar uma dose de dTpa a cada gestação a partir da 20a semana, independente de vacinação anterior
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)	Duas doses com intervalo de 8 a 12 semanas, independentemente da idade
Pneumo 13 (VPC13)	Uma dose. Após intervalo de 2 meses, aplicar pneumo 23. No caso de vacinação anterior com pneumo 23, aplicar uma dose de pneumo 13 com intervalo de 12 meses entre as vacinas
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (23- valente)	Duas doses com intervalo de cinco anos, independentemente da idade. Observar um ano de intervalo entre a pneumo 23 e a pneumo 13.
Vacina influenza inativada (INF3)	Uma dose anual
MenACWY ou Meningo C	Duas doses com intervalo de 8 a 12 semanas e revacinar a cada 5 anos.
Febre amarela (vírus vivo atenuado)	Individualizar o risco/benefício conforme a condição imunológica do paciente e a situação epidemiológica da região. Vacinar quando LTCD4+ acima de 200 células/mm3 há pelo menos 6 meses. Contraindicada em gestantes – avaliar risco benefício de acordo com a situação epidemiológica
Tríplice viral (SRC) (vírus vivo atenuado)	Duas doses para qualquer idade observando a categoria imunológica
Varicela (VZ) (vírus vivo atenuado)	Duas doses com intervalo de três meses em suscetíveis(a), com LT-CD4+ acima de 200 células/mm3 há pelo menos 6 meses.

*(HBsAg não reagente, anti-HBc total não reagente, anti-HBs não reagente)

7 - Prescritor

Tipo de conselho

Data:

UF do conselho:

Nº do conselho

(carimbo e assinatura)

Categorias imunológicas para vacinas com vírus atenuados:

- Maior ou igual a 350 células/mm3: Indicar o uso.
- 200 a 350 células/mm3 (15%-19%): Avaliar parâmetros clínicos e risco epidemiológico para a tomada de decisão .
- Abaixo de 200 células/mm3: não vacinar .
- Contraindicadas durante a gestação.